

# 風疹 警報 公告



## 為了胎兒請接種 「風疹疫苗」

孕婦，尤其是妊娠早期之女性若感染風疹，出生的嬰兒有可能患有「先天性風疹症候群」之疾病。「先天性風疹症候群」有耳不靈、眼不清、先天性心臟病等症狀及發育不良等。為了避免新生兒患有這些疾病，請家人們一起檢討接種風疹疫苗。風疹是可以透過接種疫苗來防止的感染症。

### 女性妊娠前



#### 請檢討接種風疹疫苗

接種後2個月間需避  
孕  
接種次數，包括兒童時期接  
種共計兩次。

### 成人男性

未曾感染過風疹者  
未曾接種風疹疫苗者  
上述兩種皆不明者



#### 請檢討接種疫苗

即使接種2次也沒問題

### 孕婦之家族



#### 請檢討接種疫苗

孕婦不能接種風疹疫苗

1歲兒童(第1期)及小學  
入學學前1年間(第2期)  
請定期接種麻疹、風疹混  
合疫苗。

- ◆目前發病者成人為多，特別是10代後半～50代前半的男性、10代後半～30代前半的女性多發病。
- ◆尤其是1979(昭和54年)年4月2日～1995(平成7年)年4月1日出生的男女接種率低，昭和54年4月1日以前出生的男性在兒童時無定期接種的機會。
- ◆接種風疹時，建議接種可預防麻疹的麻疹風疹混合疫苗(MR)。
- ◆諮詢 就近的保險福祉事務所。